

EAST SIDE MEDICAL PC

Mukul Arya, M.D.

GASTROENTEROLOGY

www.NYCEndoscopy.com



1056 Fifth Avenue, Office #1CD

(Between 86th and 87th Sts.)

New York, NY 10028

T: 646 410 0702 **F:** 855 332 4757

2101 Avenue X, Brooklyn, NY 11235

T: 646 650 5628 **F:** 855 332 4757

INSTRUCCIONES Y PREPARACIÓN PARA UNA ENDOSCOPIA

Fecha del Procedimiento _____ Hora _____ Hora de Llegada _____

Procedimiento:

- Endoscopia (EGD)
- Dilatacion Esofagica
- Enteroscopia
- ERCP
- Ultrasonido Endoscopico (con o sin aspiración con aguja fina FNA)

Preparacion:

Si usted esta tomando Coumadin, Lovenox, o agentes contra las plaquetas (Tielid o Plavix), consulte con su medico.

Si toma medicamentos para bajar de peso como Ozempic, Wegovy o Mounjaro, la última dosis debe administrarse al menos 7 días antes del procedimiento y necesitará seguir una dieta de líquidos claros el día anterior del procedimiento.

TRES dias antes del examen deje de tomar anti-inflamatorios sin esteroides (AINE) Motrin, Advil, Aleve, ect. Tylenol esta permitido.

EL DIA ANTES del examen no coma ni beba nada después de la medianoche. Usted debe tener el estómago vacío para permitir un examen adecuado. Si tiene un examen a final de la tarde, usted puede tomar un desayuno de líquidos claros antes de las 6:00am. Los líquidos claros son agua, te, refrescos, caldos, café, jugos de frutas, helados de agua, y gelatina. No tome leche o crema en su café o té.

MAÑANA DEL EXAMEN debe tomar sus medicamentos regulares (medicamentos de la presión arterial, medicamentos para el Corazón, etc.) con un poquito de agua. Si tiene alguna duda por favor pregunte.

Para que este procedimiento se pueda realizar usted necesita tener una persona que lo llevará a su casa. Usted no será dado de alta del centro si no va acompañado por un adulto que lo conduzca a su casa, o que lo acompañe a su casa en taxi o en transporte público.

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

La endoscopia de la parte superior es un procedimiento para examinar las paredes del tracto gastrointestinal superior como el esofago, estomago, y el duodeno (la parte del intestino delgado superior). Anormalidades pueden visualizarse directamente y muestras de tejidos se pueden obtener durante el mismo examen. Los sedantes son dados de manera intravenosa para que se sienta más cómodo/a. Cualquier alergia a medicamentos conocidos o reacciones adversas a los medicamentos deben ser comunicados antes del procedimiento.

El instrumento utilizado es un tubo flexible que contiene un canal hueco y una micro plaquita de video/lente que permite la inspección visual directa y permite la realización de biopsias, hemostasis, la inyección de medicamentos, la dilatacion, la sonda de laser, etc. A veces un anestésico local se aplica a la parte posterior de la garganta a través de aerosol o para hacer gárgaras, para hacer un pase más fácil. Por lo general el examen dura 5-20 minutos, pero la duración depende de lo que haya que hacer.

Después del procedimiento usted será llevado a la sala de recuperación donde permanecerá por unos treinta minutos, pero este tiempo puede variar de acuerdo a su condición. Los efectos de la sedación pueden durar hasta 24 horas. Se le dará a usted instrucciones detalladas de descarga antes que le den de alta. Por favor haga una cita de seguimiento en la oficina del doctor para discutir las recomendaciones de tratamiento, el plan, los medicamentos, y los resultados de las biopsias.

RIESGOS:

Ningún procedimiento puede garantizar el 100% de precisión diagnostic y todos implican algún riesgo. La decisión de proceder se hace después de evaluar los riesgos y beneficios potenciales. Las complicaciones graves son raras e incluyen pero no se limitan a perforación, hemorragia, infección, aspiración a medicamentos, y la necesidad de cirugía o transfusión debido a una de las complicaciones mencionadas. Estas ocurrencias son raras. Más comúnmente dolor de garganta y la sensación de hinchazón pueden ocurrir y persistir después del examen. A hacer gárgaras con agua salada puede proveer algún alivio para el dolor de garganta, y el gas pasar de forma espontánea. Si usted desarrolla dolor severo en el cuello, el pecho, o dolor abdominal, una temperatura elevada, dificultad para tragar o respirar, inmediatamente comuníquese con esta oficina. Si no puede contactar la oficina, preséntese a la sala de emergencias más cercana para una evaluación.

**Si tiene que cancelar su cita por favor llame a la oficina al (646)410-0702
Se require 48 horas de aviso para cancelación.**

Instrucciones adicionales:
