

EAST SIDE MEDICAL PC

Mukul Arya, M.D.

GASTROENTEROLOGY

www.NYCEndoscopy.com



1056 Fifth Avenue, Office #1CD

(Between 86th and 87th Sts.)

New York, NY 10028

T: 646 410 0702 **F:** 855 332 4757

2101 Avenue X, Brooklyn, NY 11235

T: 646 650 5628 **F:** 855 332 4757

**PREPARACION PARA UNA COLONOSCOPIA/ECOGRAFIA RECTAL
CON SUTAB**

Fecha del procedimiento _____ Hora _____ Hora de llegada _____

Si está tomando Plavix, aspirina, Coumadin, Eliquis, Pradaxa o Aggrenox debido a antecedentes de stents coronarios, carotideos, etc., es fundamental tomar la dosis y el horario adecuados antes, durante y después del procedimiento. Asegúrese de consultarlo con su médico.

Si toma medicamentos para bajar de peso como Ozempic, Wegovy o Mounjaro, la última dosis debe administrarse al menos 7 días antes del procedimiento

TRES días antes del examen deje de tomar anti-inflamatorios sin esteroides (AINE-Motrin, Advil, Aleve, etc). Usted puede tomar Tylenol

SUTAB es un tratamiento de dosis fraccionada (2 días). La preparación completa para la colonoscopia requiere un total de 24 comprimidos. Usted tomará los comprimidos en dos dosis de 12 comprimidos cada una. Cada dosis de SUTAB debe tomarse con agua, y debe beber agua adicional luego de cada dosis.

Le recomendamos que se mantenga bien hidratado antes, durante y después de tomar SUTAB

Trague los 12 comprimidos con las primeras 16 onzas de agua

El día anterior a la colonoscopia, abra el primer frasco de 12 comprimidos y tome SUTAB como se describe a continuación.

PASO 1 Abra un frasco de 12 comprimidos. Retire y deseche el desecante.

Retire y deseche el desecante del segundo frasco y cierre el frasco. Use el segundo frasco para la segunda dosis en la mañana de la colonoscopia.

PASO 2 Llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado).

Trague un comprimido cada uno o dos minutos. Debe tomar los 12 comprimidos y las 16 onzas de agua en menos de 20 minutos.

IMPORTANTE: Si presenta síntomas relacionados con el preparado (por ejemplo, náuseas, distensión abdominal o cólicos), tome una pausa o reduzca el ritmo al que bebe el agua adicional hasta que disminuyan sus síntomas.

Beba los 2 recipientes adicionales con 16 onzas de agua cada uno

PASO 3 Aproximadamente una hora después de tomar el último comprimido, llene nuevamente el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda el agua en un lapso de 30 minutos.

PASO 4 Aproximadamente treinta minutos después de terminar de beber el segundo recipiente de agua, llene nuevamente el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda el agua en un lapso de 30 minutos.

Día 2, dosis 2: en la mañana de la colonoscopia (de 5 a 8 horas antes de la colonoscopia y no antes de 4 horas después de iniciar la dosis 1)

Trague los otros 12 comprimidos con otras 16 onzas de agua

Continúe bebiendo solo líquidos claros hasta después de la colonoscopia.

Repita los pasos 2 al 4 del día 1, dosis 1.

Si presenta síntomas relacionados con el preparado (por ejemplo, náuseas, distensión abdominal o cólicos), tome una pausa o reduzca el ritmo al que bebe el agua adicional hasta que disminuyan sus síntomas.

Tome todos los comprimidos de SUTAB y el agua al menos dos horas antes de la colonoscopia.